

Virustartuntojen vastustus nautatiloilla

Toimenpideohjeet kaikille tiloille (ripulit, hengitystietulehdukset)

1. Kun kuulet virustartuntoja olevan liikkeellä, tehosta kaikkia tilasi tautisuojaustoimia entisestään. www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
2. Älä osta pitoeläimiä tartunta-alueelta. Pyydä aina Nasevasta saatava terveystilanneraportti ja terveystodistuksella lisätietoa ostettavien eläinten ja niiden lähtökarjan terveystilanteesta. Suositeltavaa on käyttää tulokaranteenia kaikille tilalle tuleville uusille eläimille.
3. Älä käy muilla nautatiloilla varsinkaan tuotantotiloissa.
4. Varaa navettaasi pakollisille kävijöille asialliset suojavaatteet ja -jalkineet. Järjestä kunnollinen käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesu- ja desinfiointimahdollisuus. Varaa seminologin tai eläinlääkäriin ym. laukkaa varten puhdas pöytätaso. Huolehdi, että myös huoltomiehet, asentajat yms., jotka käyvät muillakin tiloilla, noudattavat samoja suojautumistoimia.
5. Maitoauton kuljettajalle tulisi aina olla oma ovi maitoahuoneeseen. Pidä maitoahuoneeseen johtavat kulkuväylät puhtaana.
6. Järjestä rehujen purkupaikka siten, ettei rehuauton kuljettajan tarvitse kulkea tuotantotiloissa. Esim. nestemäisiä rehuja varten asennetaan purkuliitin ulkoseinään tai märkärehusäiliö siirretään pois eläintiloista.
7. Tilalta lähteviä eläimiä varten tulisi olla lastaustila tai lastausvaunu. Älä päästä kuljettajaa eläintiloihin, vaan vie itse eläimet ulko-ovelle.
8. Mikäli havaitset karjassasi eläimestä toiseen leviäviin virustartuntoihin viittaavia oireita, kuten vetistä ripulia ja syömättömyyttä, yskää, sierainvuotoa ja/tai kuumetta, ota heti yhteyks eläinlääkäriin.

Lisäohjeet tiloille, joilla on virustartuntaan viittaavia oireita

1. Ilmoita oireista! Laita Nasevaan merkintä erityistilanteesta. Ilmoita aina tilalle tulossa oleville kävijöille tartuntaepäilystä tai todetusta tartunnasta
 - eläinlääkärille
 - teurastamon hankintaan, jos olet lähettämässä eläimiä teuraaksi tai myymässä välitysvasikoita
 - meijerin, teurastamon ja ProAgrian tuotantoneuvojalle
 - seminologille ja päivystykseen reittisuunnittelua varten
 - sorkkahoitajalle
 - rehuntoimittajalle, mikäli olet tilaamassa uusia rehuja
 - huoltomiehelle tai asentajalle, jos välttämättömiä korjauksia tai asennuksia on tehtävä tartunnan aikana.Ilmoituksen perusteella asianosaiset voivat varautua tilanteeseen ja suunnitella reittinsä niin, että tartuntatiloilla käydään päivän viimeisenä, siirretään käyntiä tai he osaavat muuten varautua riittävin suojatoimenpitein.
2. Erottele syntyvät ja välitysvasikat vanhemmista eläimistä. Taudinpurkaustilanteissa pidättäydy eläinten myynnistä.
3. Pidä erillään syntyneet ja erityisesti välitykseen lähtevät terveet vasikat ja muut tilalta pois siirrettävät terveet eläimet sairaista tai aiemmin sairastuneista eläimistä ainakin kuukauden ajan ennen siirtoa. Ks. erillinen välitysvasikkaohje.
4. Tartunnan leviämistä eri eläinryhmien välillä voit estää rajoittamalla eläinten välisiä suoria ja epäsuoria kontakteja: umpinaiset karsina-aidat, omat ruokinta- ja juottovälineet kullekin ryhmälle, ei rehujen siirtelyä eläinryhmien välillä. Huomioi myös työjärjestyksessä ettet levitä tartuntoja sairastuneista terveisiin.
5. Virustartuntojen osoittamiseksi/tunnistamiseksi voidaan oireilevista naudoista ottaa näytteitä eläinlääkäriin ohjeen mukaan.