

## Eläinvälitys *Mycoplasma bovis* – tartunnan saaneilta tiloilta

Tilat ja niiden sopimuseläinvälittäjät noudattavat seuraavia ohjeita vasikkavälityksessä, jotta avoin toimintatapa tautivastustuksessa voidaan ylläpitää. Ohjeiden tarkoituksena on turvata tartunnan saaneiden tilojen vasikoiden jatkokasvatus ja minimoida tartunnan leviäminen nautaketjussa. Tämä edellyttää tilan, eläinvälittäjän ja tilan riskinhallinnasta vastaavan eläinlääkärin yhteistyötä.

- 1) Tila ilmoittaa epäilystä tai todetusta tartunnasta sopimuseläinvälittäjälleen ja mahdollisille muille eläintensä vastaanottajille.
- 2) Tila varmistaa kuuluvansa NASEVAAN ja yhteistyökumppaneilleen antamansa valtuutukset, jotta tartunnan leviämistä ketjussa voidaan mahdollisimman tehokkaasti estää.
- 3) Tila selvittää omat ja yhteistyökumppaniensa mahdollisuudet kasvattaa mahdollisen tartunnan saaneet vasikat.
- 4) Välitykseen myytävät vasikat erotetaan heti syntymästään tilan lehmistä ja vanhemmista mahdollisesti tartunnan saaneista vasikoista. Tämä toteutetaan mieluiten siirtämällä vasikat erilliseen puhtaaseen osastoon. Vaihtoehtoisesti vasikat voidaan erotella toisistaan pisaratartunnat estävillä väliaitalevyillä, igluilla tai toisistaan riittävän erillään olevilla muilla karsinajärjestelyillä. Mitä tarkemmin erottelu toteutetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vasikoille löydetään sopiva vastaanottaja.
- 5) Tilan eläinlääkäri laatii tilalle riskienhallintasuunnitelman. Se tallennetaan NASEVAN "Tautitorjunta"-valikkoon. Tila noudattaa riskienhallintasuunnitelmaa. Tilan eläinlääkäri seuraa sen toteutumista.
- 6) Tutkimukset joko a tai b kohdan mukaisesti
  - a) Koko karja tutkitaan EVIRAN ohjeiden mukaisesti tartunnan toteamisen ja edellä esitettyjen välittömien ennaltaehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen (2-4 vke tartunnan toteamisesta ja toimenpiteiden aloittamisesta). Tutkimus uusitaan kahteen kertaan noin puolen vuoden välein. Tutkimuskustannuksista sovitaan yhteistyökumppanien kanssa.
  - b) Tartunnan jälkeen riskienhallintasuunnitelman ohjeiden mukaisesti eristetyt vasikat tutkitaan 2-4 vk ikäsinä sierainlimanäytein.
- 7) Eviran ohjeiden mukaisesti tutkitut muista eläimistä erotetut vasikat voidaan välittää lihanautatiloille vähäriskisinä välitysvasikoina, jos niillä ei ole todettu *M. bovis* - tartuntaa.
- 8) Eläinvälittäjä arvioi tilan eläinten aiheuttaman riskin tapauskohtaisesti yhteistyössä tilan riskienhallinnasta vastaavan eläinlääkärin kanssa ja ohjaa tutkimattomat tai mahdollisesti tartunnan saaneet vasikat harkintansa mukaan tiloille, joille tartunta on jo todennäköisesti levinnyt aiemmin myytyjen vasikoiden mukana. Jos tällaisia tiloja ei ole käytettävissä, vasikoita ei myydä ennen kuin vasikoiden aiheuttama riski voidaan tehtävien tutkimusten perusteella arvioida olevan vähäinen.
- 9) Eläinvälittäjä ei ole velvollinen välittämään *M. bovis* - tartunnan saaneita tai hengitystietulehduksia sairastaneita vasikoita, jos niille ei löydetä sopivaa vastaanottajaa.
- 10) Tila varautuu lopettamaan tai teurastuttamaan vasikat, joille ei löydetä sopivaa kasvattajaa.
- 11) Jos tilalta välitettyjen vasikoiden huomataan aiheuttavan ongelmia jatkokasvatuksessa, ei tilalta voida välittää uusia vasikoita, ennen kuin riskienhallintatoimenpiteillä on varmistuttu vasikoiden vähäriskisyydessä.
- 12) Tilan eläimiä ei viedä lypsy- tai emolehmäkarjoihin.