



ETU- Nautatautiryhmä 19.03.2008



TARTTUVIEN SORKKASAIRAUKSIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA

”PELISÄÄNNÖT”

Tilojen välisessä ja eri yhteisöjen harjoittamassa jalostuseläinkaupassa sekä välityseläinkaupassa suositellaan käyttämään seuraavia periaatteita. Tarttuvilla sorkkasairauksilla tarkoitetaan tässä **sorkkavälin** ihotulehdusta, **sorkkavälin ajotulehdusta** sekä **sorkka-alueen ihotulehdusta**.

LÄHTÖTILA

Tilalla, jolla on taudinpurkaus:

- **oireilevia eläimiä** ei saa myydä
- **oireettomia, erillisessä tilassa olevia** vasikoita tai muita nautoja voidaan myydä seuraavasti:
 - o ennen siirtoa sorkat on puhdistettava, tarkastettava sekä desinfioitava (ks. alla).
- **eläinryhmästä tai navetasta, jossa on esiintynyt sairastumisia** voidaan eläimiä myydä seuraavasti:
 - o oireettomia eläimiä 4 viikkoa oireiden häviämisen jälkeen
 - o ennen siirtoa sorkat on puhdistettava, tarkastettava sekä desinfioitava (ks. alla).
- taudinpurkauksesta **on ilmoitettava teurastamon eläinvälitykseen**, jotta tauti huomioidaan eläinten hakujärjestelyissä
- lypsykarjatilalla **vasikat on hyvä vieroittaa heti** ja kasvattaa oireilevista eläimistä erillisessä tilassa

OSTAJATILA

Etenkin jalostuseläimiä ostettaessa on syytä selvittää lähtötilan tautitilanne. Ostettaessa eläimiä tilalta, jolla on todettu taudinpurkaus, suositellaan ostoeläimille vähintään kahden viikon **karanteenia** ostajatilalla. Eläinten tullessa karanteeniin sorkat on puhdistettava, tarkastettava ja desinfioitava (ks. alla). Karanteenin päättyessä tarkastetaan ja puhdistetaan sorkat uudelleen ja toistetaan desinfiointi. Toimenpiteillä ei kuitenkaan voida taata täydellistä tautisuojausta edellä mainittujen tarttuvien sorkkasairauksien varalta.

Sorkkien puhdistus ja desinfiointi

Sorkat sekä jalan alaosa vuohisniveältä myöten pestään esim. painepesurilla pientä painetta käyttäen; likaisten sorkkien desinfioinnista ei ole hyötyä. Puhtaat sorkat desinfioidaan tarkoitukseen sopivalla desinfiointiaineella käyttäen esim. reppu- tai paineruiskua tai sorkkakylpyallasta. Desinfiointiin voidaan käyttää yleisesti käytössä olevia desinfiointiaineita, kuten peroksiedeja, glutaraldehydiä, orgaanisia happoja tai kvaternaalisia ammoniumyhdisteitä. Sopivia valmisteita ovat esimerkiksi Hygisept, Kickstart, Parvocide, Virkon-S, Virocid sekä eräät sorkkakylpyaineet. Valmistajan antamia laimennussuosituksia ja käyttö-turvallisuusohjeita tulee noudattaa.