

Ajankohtainen muistilista lintuinfluenssasta!

Lintuinfluenssan leviäminen:

- Helposti leviävä virustartunta.
- Leviää suoran eläinten välisen kontaktin, viruksella saastuneen rehun, veden, työvälineiden, ihmisen, haittaeläinten yms. välityksellä.
- Oireettomatkin tartunnan saaneet luonnonvaraiset linnut, etenkin vesilinnut, voivat levittää tartuntaa. Riskipaikkoja ovat vesistöt/kosteikot ja muuttolintujen levähdyspaikat.
- Virus säilyy pitkään eläimen ulkopuolella, ennen kaikkea viileässä ja kosteassa ympäristössä.
 - o todettu säilyvän esim. lietteessä 105 vrk, kuivalannassa 30-35 vrk (4°C) / 7 vrk (20°C).
 - o löydetty myös luonnonvesistä, kuten järvistä.
- Virus tuhoutuu esim. kuumentamalla (56°C 3h, 60°C 30 min.) ja desinfioidulla yleisimmin käytössä olevilla desinfiointiaineilla.

ETT ohjeet lintuinfluenssariskin hallitsemiseksi

- Kaikki siipikarja pidetään sisätiloissa.
- Tautisulkua on ehdottomasti käytettävä kaikissa siipikarjayksiköissä: jalkineiden ja suojavaatteiden vaihto heti ulko-ovella, mutta jalkineiden vaihto myös eri osastojen ja esim. munahuoneen ja eläintilojen välillä. Käsien pesu aina siipikarjayksikköön mentäessä.
- Kaikkien siipikarjatilalla kävijöiden on noudatettava [tilakäyntiohjetta](#).
- Rehut on suojattava luonnonvaraisilta linnuilta ja jysijöiltä, samoin kuin ilmastointikanavat verkoilla.
- Siipikarjan kontakteja luonnonvaraisiin lintuihin on vältettävä kaikin mahdollisin tavoin: ei luonnonvaraisten lintujen ruokintaa siipikarjayksikön läheisyydessä!
- Tuottajien tulee välttää vesilinnustusta ja vesilintujen käsittelyä. Riistan käsittelyn jälkeen kädet ja välineet pestään ja desinfioidaan, riistan perkuujätteet hävitetään asianmukaisesti (paperipussiin ja raadonkeräilyyn tai polttoon), eikä siipikarjayksikköön mennä koskaan samoilla vaatteilla tai peseytymättä linnustuksen jälkeen.

Mitä teet, jos löydät kuolleita villilintuja?

Luonnonvaraisten vesilintujen joukkosairastumisista tai -kuolemista tulee heti ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Jos siipikarjassasi esiintyy tavallisuudesta poikkeavia oireita, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin, joka antaa sinulle menettelyohjeet.

Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi seuraavat muutokset:

- rehun ja veden kulutuksen pieneneminen yli 20 prosentilla,
- munantuotannon pieneneminen yli viidellä prosentilla yli kahden päivän ajaksi, tai
- kuolleisuusasteen nousu yli kolmeen prosenttiin viikossa.