

Varo lintuinfluenssaa!

Lintuinfluenssan leviäminen

- Helposti leviävä virustartunta.
- Leviää suoran eläinten välisen kontaktin, viruksella saastuneen rehun, veden, työvälineiden, ihmisen, haittaeläinten yms. välityksellä.
- Oireettomatkin tartunnan saaneet luonnonvaraiset linnut, etenkin vesilinnut, voivat levittää tartuntaa. Riskipaikkoja ovat vesistöt/kosteikot ja muuttolintujen levähdyspaikat.
- Virus säilyy pitkään eläimen ulko-puolella, ennen kaikkea viileässä ja kosteassa ympäristössä.
 - o Lietteessä 105 vrk, kuivalannassa 30-35 vrk 4 °C ja 7 vrk 20 °C.
 - o Löydetty myös luonnonvesistä, kuten järvistä.
- Virus tuhoutuu esim. kuumentamalla (56 °C 3 h, 60 °C 30 min.) ja desinfioimalla yleisimmin käytössä olevilla desinfiointiaineilla.

Mitä teet, jos löydät kuolleita villilintuja?

- Luonnonvaraisten vesilintujen joukkosairastumisista tai -kuolemista tulee heti ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Huomioi [Ruokaviraston ohjeet](#).

ETT ohjeet lintuinfluenssariskin hallitsemiseksi

- Kaikki siipikarja pidetään sisätiloissa.
- [Tautisulku](#) käyttöön kaikissa siipikarjayksiköissä:
 - o jalkineiden ja suojavaatteiden vaihto sisäänkäynnissä
 - o jalkineiden vaihto eri osastojen ja esim. munahuoneen ja eläintilojen välillä.
 - o Käsien pesu aina kanalaan mentäessä ja sieltä lähdettäessä.
- Kaikkien siipikarjatilalla kävijöiden on noudatettava [ETTn tilakäyntiohjetta](#).
- Rehut on suojattava luonnonvaraisilta linnuilta ja jyräjiltä, samoin kuin ilmastointikanavat verkoilla.
- Siipikarjan kontakteja luonnonvaraisiin lintuihin on vältettävä kaikin mahdollisin tavoin. Luonnonvaraisia lintuja ei pidä ruokkia siipikarjayksikön läheisyydessä.
- Siipikarjan kanssa työskentelevien tulee välttää vesilinnustusta ja vesilintujen käsittelyä.

Lintuinfluenssatartuntaan siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi esim. seuraavat muutokset

- a) rehun ja veden kulutuksen pieneneminen yli 20 %:lla
- b) munantuotannon pieneneminen yli 5 %:lla yli kahden päivän ajaksi
- c) kuolleisuusasteen nousu yli 3 %:iin viikossa.

Jos siipikarjassasi esiintyy tavallisuudesta poikkeavia muutoksia tai oireita, ota heti yhteyttä eläinlääkəriin, joka antaa sinulle tarkemmat menettelyohjeet.

[Toimintaohje siipikarjan sairauden syyn selvitykseen](#)