

## VÄLITYSVASIKKAOHJE

Kun myyt teurastamon kautta välitysvasikoita, noudata turvallisen eläinkaupan pelisääntöjä ja myy vain terveitä eläimiä. Yksikin sairas tai piilevästi sairas eläin voi sairastuttaa vastaanottajatilän koko karjan.

1. Huolehdi, että tilasi kuuluu Nasevaan, terveydenhuoltokäynnit tehdään säännöllisesti ja erityistilannemerkinnot ovat ajan tasalla.

2. Älä vaaranna karjasi terveystilannetta ostamalla huonomman tai tuntemattoman terveystason tiloilta eläimiä. ETT:n eläinkaupan ohjetta ([linkki](#)).

3. Voit myydä vasikoita normaalisti välitykseen, jos karjassasi ei esiinny tarttuvia tauteja kuten suolisto-, sorkka- tai hengitystietulehduksen eikä pälvisilsan oireita.

4. Ilmoita välittömästi tarttuvien tautien oireista tai tautiepäilystä teurastamon eläinvälitykseen ja muille tarvittaville tahoille. Noudata tautitapauksissa seuraavia ohjeita:

- Jos karjassasi **esiintyy ajoittain** suolisto-, sorkka- tai hengitystietulehdusten oireita
  - Erotta myytävät, oireettomat vasikat sairastuneista tai niihin kontakteissa olleista eläimistä erilliseen osastoon tai vähintään kiinteällä levyaidalla, mikä estää eläinten suoran kontaktin ja tartunnan leviämisen eritteiden ja lannan välityksellä.
  - Pidä välitysvasikat erillään sairaista eläimistä vähintään 2 vk ennen välitystä
  - Varaa ruuhka- tai taudinpurkaustilanteita varten riittävästi igluja tai muita karsinoita, jotta kunnollinen erillään pito voidaan toteuttaa
- Jos karjassasi puhkeaa usean eläinryhmän kattava hengitystietulehdus-, suolisto- tai sorkkasairaus **epidemia** tai et pysty pitämään myytäviä eläimiä erillään sairastuneista eläimistä, myy eläimiä vasta kuukauden (1 kk) kuluttua oireiden paranemisesta.
- Jos karjassa on todettu pälvisilsi, voit myydä vasikoita, jos rokotusten aloittamisesta on kulunut 6 kk, saneeraus- ja jatkotoimenpiteet on tehty ja eläimet ovat olleet täysin oireettomia vähintään 3 kk ajan.

5. Noudata ETT:n ja teurastamoiden ohjeita [Mycoplasma bovis](#)-tartunnan osalta.

6. Noudata teurastamon ohjeita salmonellatutkimuksien osalta.

Suositus: salmonellatutkimus kerran vuodessa tai salmonellaepäilytapauksessa. Älä myy vasikkaa silloin kun salmonellatutkimus on kesken.

7. Huolehdi asianmukaisesta tautisuojauksesta lastauksen yhteydessä. Siirrä eläimet erilliseen lastaustilaan tai noutopaikkaan tai tuo ne ulos ([linkki ohjeisiin](#)). Pese ja desinfioi karjan lastausalue aina lastauksen jälkeen.

8. Eläinten käsittelyn lastauksessa on oltava asianmukaista. Varmista että vasikoiden lastaus on helposti toteutettavissa tilallasi.

**Vasikan välityskelpoisuuden tarkistuslista:**

1. Vasikka on merkitty ja rekisteröity 7 vrk:n sisällä syntymästä. Samalla rekisterinumerolla olevat korvamerkit ovat molemmissa korvissa. Kaikilla välitykseen lähtevillä vasikoilla on apumerkinä eMerkki, joka on kiinnitetty vasikan vasempaan korvaan.
2. Napa on kuiva ja parantunut.
3. Vasikka hengittää normaalisti eikä sillä ole hengitystietulehduksen oireita.
4. Jalat ovat terveet, ja vasikka seisoo ja kävelee normaalisti.
5. Vasikalla ei ole ripulia eikä ihomuutoksia. Vasikka on puhdas ja sillä on hyvä karvapeite.
6. Vasikka on saanut riittävästi ravintoa ja on ikäisekseen normaalisti kehittynyt. Varmista tarvittaessa vasikan riittävä paino (40 kg) ja päiväkasvu punnitsemalla tai mittaamalla (päiväkasvu vähintään 450 g/pv). Ota huomioon lainsäädännön vaatimukset (kuten välitysikä) ja eläinvälittäjäsi mahdolliset vasikkaryhmäkohtaiset vaatimukset.
7. Vasikka on saanut hyvälaatuista ternimaitoa 6 tunnin sisällä syntymästä. Vasikka on saanut juomansa imemällä. Vieroitettuna myytävä vasikka on vieroitettu juotolta vähintään viikkoa ennen välitystä ja osaa syödä kuivarehua. Vierihoidossa ollut vasikka on opetettu juomaan myös tutista.
8. Jos vasikka nupoutetaan, se tehdään suositusten mukaisesti eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen. Ternivasikoita ei suositella nupoutettavan.

**Välitysvasikan laatu poikkeamat**

Tuottaja ja kuljettaja tarkistavat vasikan välityskelpoisuuden. Pääsääntöisesti kaikki vasikat, jotka eivät ole terveitä, jätetään syntymätilalle hoidettaviksi ja noudetaan myöhemmin, kun vasikka on parantunut. Poikkeus voidaan tehdä, mikäli sairaus tai vaiva on lievä ja hoidettavissa vastaanottajatilalla. Laatu poikkeaman aiheuttamat hoitokustannukset voidaan vähentää vasikan hinnasta.

**Vasikoiden lievät laatu poikkeamat, vasikka voidaan välittää**

- Pieni napatyrä tai lievä ulkoisen navan tulehdus
- Vähäinen karvattomuus, lievä ihotulehdus

**Vasikoiden sairaudet/vaivat, jotka on hoidettava ennen välitystä**

- Jos pikkuvasikat ovat hiemankin lantaisia, niiden kasvatusolosuhteita on parannettava. Vasikat on puhdistettava, jos eläimen karvapeite on lannan liikaama (yli 20 %).
- Selvä napatyrä
- Vakava napatulehdus: napa on paksuuntunut, aristava, märkivä ja/tai tulehdus jatkuu vatsaonteloon
- Nivel tulehdus ja pahat hiertymät raajoissa
- Hengitystietulehdus: yskä, silmä- tai sierainvuoto, kuume, voimistunut ja tihentynyt hengitys
- Ripuli: löysä, vetinen uloste, likaantunut peräpää
- Pälvisilsa ja muut voimakkaat ihomuutokset
- Kuume (ruumiinlämpö yli 39,5°C)
- Vasikka on ikäisekseen alikehittynyt tai alle 40 kg ternivasikka

HUOM! Pyydä eläinlääkäri tutkimaan ja hoitamaan tautitapaukset. Jos tilalla on akuutti ja tarttuva taudinpurkaus tai välitykseen ilmoitettu eläin sairastuu, siitä on ilmoitettava teurastamon eläinvälitykseen. Laita erityistilannemerkintä Nasevaan.