



**RUOKAVIRASTO**  
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

---

# IB eli kanan tarttuva keuhkoputkentulehdus - Suositellut rokotusohjelmat 2023

---

**24.5.2023**

IB-työryhmä

Pia Vennerström

# MunintakanaEMOJEN (isovanhempais- ja vanhempaispolvi) Rokotusohjelma IB-tautia vastaan 2023



Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
1 vrk	Ma + 4/91	Elävä	Sumute	Hautomo tai kasvattamo
6 viikkoa	Ma (+QX*)	Elävä	Juomavesi	
12 viikkoa	4/91	Elävä	Juomavesi	Annettava vähintään 2 viikkoa ennen siirtoa
Siirto	Nobilis IB multi	Tapettu	Injektio	Erytyislupavalmiste
Muninnan aikana 6-8 viikon välein	Ma ja 4/91 vuorotellen	Elävä	Juomavesi	Aloitus Ma Aikaisintaan 27 vk iässä, kun muninta lähtenyt hyvin alkuun

\*riippuu tartuntapaineesta

# Munintakanojen rokotusohjelma IB-tautia vastaan 2023



Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
1 vrk	Ma + 4/91	Elävä	Sumute	Hautomo tai kasvattamo
6 viikkoa	Ma	Elävä	Juomavesi	
12 viikkoa	4/91	Elävä	Juomavesi	Annettava vähintään 2 viikkoa ennen siirtoa
Muninnan aikana 6 viikon välein	Ma ja 4/91 vuorotellen	Elävä	Juomavesi	Aloitus Ma, ei suositeltavaa rokottaa muninnan alkuvaiheessa (ainakaan 4/91 kannan rokotteella)



# Rokotusohjelman käynnistys IB-tautia vastaan – vanhemmat linnut kesä 2023 (suuri tartuntapaine)

(jos parvessa ei päästä aloittamaan edellä kuvattuja rokotusohjelmia alusta)

Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
3 kertaa 6 viikon välein	Ma + 4/91	Elävä	Juomavesi	Rokote voi aiheuttaa lieviä oireita*
Joka 6. viikko	Ma tai 4/91 vuorotellen	Elävä	Juomavesi	

\*Koska parvi ei kasvatuksen aikana ole saanut perusrokotuksia. Oireet kuitenkin vähemmät kuin QX-tartunta aiheuttaa. Älä käytä 4/91-kannan rokotetta, mikäli joudut rokottamaan muninnan alkuvaiheessa!

# Broilereiden rokotusohjelma IB-tautia vastaan 2023



Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
Ensimmäinen päivä	Ma5 + 4/91	Elävä	Spray	Hautomo tai kasvattamo



# Alkuvaihe

- Alkutilanteessa IB rokotuksissa on tuotu esille että on järkevämpää rokottaa kaikki tilan (tai lähistöllä) olevat linnut (myös eri-ikäiset) samaan aikaan, eikä lähestyä rokotusajankohtaa tietyn iän mukaan.
- Samanaikaisesti käytettävien rokotteiden yhteensopivuus tulisi perustua tutkittuun tietoon. Rokotevalmistajat suosittelevat vain saman valmistajan rokotteiden yhteiskäyttöä.
- Eri rokotevalmistajilla eri kannat käytössä ja tämä olisi myös huomioitava mikäli käytetään usean rokotevalmistajan rokotteita ohjelmaan.
- Elävien rokotteiden käsittely vaatii tarkkuuta. Väärä rokotekäsittely tuhoaa elävän rokotteen virukset jolloin rokotusten teho heikkenee

# Fimean hyväksymät IB-rokotteet Suomessa

(päivitetty 6.6.2023)



- Myyntilupa
  - Poikkeuslupa (saa tuoda maahan muissa kuin suomen- ja ruotsinkielisissä pakkauksissa)
    - Nobilis IB 4/91 (MSD, lupa myönnetty 23.5.2023)
    - Nobilis IB Primo QX (MSD, lupa myönnetty 24.5.2023)
- Määräaikainen erityislupa (eläinlääkärin ei tarvitse hakea valmistekohtaista erityislupaa)
  - Nobilis IB Ma5 (MSD, lupa myönnetty 23.5.2023)
  - CEVAC IBird (Ceva, vastaa 4/91-tyypin virusrokotetta, lupa myönnetty 24.5.2023; Broilereille ja munintakananuorikoille. Toistuva käyttö muniville kanoille on osoitettu turvalliseksi muninnan aikana)
  - CEVAC Mass L (Ceva, lupa myönnetty 24.5.2023; Broilereille ja munintakananuorikoille. Ei saa käyttää muniville kanoille, eikä 4 viikkoon ennen muninnan alkamista)
  - Nobilis IB multi vet (MSD, lupa voimassa 12.6.2023 alkaen; inaktivoitu injektiorokote; käytetään Suomessa emonuorikoille siirron yhteydessä)