

ANVISNING OM FÖRMEDLINGSKALVAR

När du säljer förmedlingskalvar via ett slakteri, följ reglerna för säker djurhandel och sälj endast friska djur. Ett enda sjukt eller latent sjukt djur kan smitta mottagargårdens hela besättning.

1. Se till att din gård tillhör Naseva, hälsovårdsbesök görs regelbundet och de specialsituationsmärkningarna är uppdaterade.
2. Äventyra inte din boskaps hälsosituation genom att köpa djur från gårdar med en lägre eller okänd hälsolivå. ETT:s riktlinjer för handel med djur ([länk](#)).
3. Du kan sälja kalvar till förmedling som vanligt, om det förekommer inte några smittsamma sjukdomar såsom tarm-, klov- eller luftvägsinfektion eller symtom på ringorm på din boskap.
4. Meddela omedelbart slakteriets djurförmedling och andra nödvändiga parter om symtom eller misstanke om infektionssjukdomar. Följ följande instruktioner vid sjukdom:
 - Om din boskap periodvis **visar symtom** på tarm-, klöv- eller luftvägsinfektioner
 - Separera de symtomfria kalvar som ska säljas från djur som är sjuka eller har varit i kontakt med sådana i ett separat avdelning eller åtminstone med ett solid panelstängsel, som förhindrar direkt kontakt med djuren och spridning av smitta genom sekret och gödsel.
 - Håll förmedlingskalvar åtskilda från sjuka djur i minst 2 veckor före förmedlingen.
 - Reservera tillräckligt med igloos eller andra boxar för trängsel- eller sjukdomsutbrottsituationer att korrekt isolering kan utföras.
 - Om en tarm- eller klövsjukdom**sepidemi** eller en luftvägsinfektion, som omfattar flera djurgrupper, bryter ut i din boskap, eller om du inte kan hålla djur till försäljning åtskilda från sjuka djur, sälj djuren för en månad (1 månad) efter symtomen har försvunnit.
 - Om boskapen har diagnostiserats med ringorm kan man sälja kalvar om det har gått 6 månader sedan början av vaccinationer, sanerings- och uppföljningsåtgärder har genomförts och djuren har varit helt symtomfria i minst 3 månader.
5. Följ instruktionerna från ETT och slakterier angående *Mycoplasma bovis*-infektion.
6. Följ slakteriets instruktioner angående salmonellaundersökning. Rekommendation: salmonellaundersökning en gång per år eller vid misstänkt salmonella. Sälj inte en kalv medan salmonellatestet pågår.
7. Ta hand om lämpligt smittskydd vid lastning. Flytta djuren till ett separat lastningsutrymme eller upphämtningsplats eller ta med dem utanför ([länk till instruktioner](#)). Tvätta och desinficera alltid lastningsområdet efter lastning.
8. Hantering av djur under lastning måste vara ändamålsenligt. Se till att det är lätt att lasta kalvarna på din gård.

Checklista för kalvens förmedlingsduglighet:

1. Kalven har märkts och registrerats inom 7 dygn efter födseln. Den har öronmärken med samma registreringsnummer på båda öronen. Alla kalvar som går till förmedling har ett eMärke som hjälpmärke, som är fäst i kalvens vänstra öra.
2. Kalvens navel är torr och läkt.
3. Kalven andas normalt och har inga symtom på luftvägsinfektion.
4. Kalven har friska ben. Den står och går normalt.
5. Kalven har ingen diarré eller hudförändringar. Kalven är ren och har bra päls.
6. Kalven har fått tillräckligt att äta och är normalt utvecklad för sin ålder. Kontrollera vid behov att den har tillräcklig vikt (40 kg) och dagstillväxt genom att väga eller mäta kalven (dagstillväxt minst 450 g/dag). Ta hänsyn till lagstiftningens krav (såsom förmedlingsåldern) och eventuella kalvgruppsspecifika krav från din djurförmedlare.
7. Kalven har fått råmjölk av god kvalitet inom 6 timmar efter födseln. Kalven har fått sin dryck genom att suga. En kalv som sålts som avvärd har avvants senast en vecka före förmedling och kan ära torrt foder. Kalven, som har ammats, har också fått lära sig att dricka ur en spene.
8. Om kalven avhornas ska ingreppet göras enligt rekommendationerna med hjälp av lugnande medel, bedövning och smärtlindring som ges av veterinären. Avhorning rekommenderas inte för spädkalvar.

Kvalitetsavvikelser hos förmedlingskalvar

Producenten och chauffören kontrollerar att kalven är i skick att förmedlas. Enligt huvudregeln ska alla kalvar som inte är helt friska stanna kvar i ursprungsbesättningen för behandling och förmedlas först senare då de är helt friska. Undantag från regeln kan göras, om problemet är lindrigt och kan behandlas i den mottagande besättningen. De vårdkostnader som uppkommer på grund av kvalitetsavvikelsen kan avdras från kalvens pris.

Lindriga kvalitetsavvikelser hos kalvar, kalven kan förmedlas:

- Lindrigt navelbråck eller lindrig yttre navelinflammation.
- Lindrigt håravfall, lindrig hudinfektion.

Kalvarnas sjukdomar/besvär som ska behandlas före förmedlingen:

- Om kalvarna är endelitet smutsade med gödsel måste uppfödningförhållande förbättras. Kalvarna ska borstas/tvättas om pälsen är smutsad med gödsel (över 20 %).
- Tydligt navelbråck.
- Allvarlig navelinflammation: navelsträngen är för tjocknad, känslig, purulent och inflammationen fortsätter i bukhålan.
- Ledinflammation och svåra skavsår på benen.
- Allvarlig inflammation i luftvägarna: hosta, rinnande näsborrar, feber, kraftig och tät andning.
- Diarré: lös, vattnig avföring, smutsig bakdel.
- Ringorm och andra allvarliga hudförändringar.
- Feber (kroppstemperatur över 39,5°C).
- Underutvecklad för sin ålder eller spädkalv som är lättare än 40 kg.

OBS! Besättningsveterinären behandlar enskilda fall. Om en akut, smittosam sjukdom bryter ut på gården, eller om ett djur som anmälts till förmedling insjuknar, måste detta anmälas till slakteriets djurförmedling. Lägg en specialsituationsmark i Naseva.