

Broilereiden jalkapohjaterveys Suomessa




Maa- ja metsätalous-
ministeriö



Eläinten terveys ETT ry



Broilereiden jalkapohjaterveyden kehitys Suomessa 2012-2023 (tilanne 31.12.2023)



Broilereiden jalkapohjaterveys 2012-2023

Vuosi	% parvista < 20 pistettä	% parvista < 40 pistettä	% parvista 40-80 pistettä	% parvista > 80 pistettä	Painotettu keskiarvo	Tilastoitu osuus tuotannosta
2012	79,20	94,46	4,91	0,62	-	n. 90
2013	80,68	95,09	4,65	0,27	-	n. 90
2014	91,42	98,09	1,76	0,15	-	97
2015	91,05	98,13	1,55	0,32	-	97
2016	92,79	98,46	1,38	0,16	-	> 99
2017	96,19	99,20	0,75	0,05	-	> 99
2018	94,20	98,54	1,28	0,18	4,28	> 99
2019	97,49	99,09	0,70	0,21	2,43	> 99
2020	98,84	99,70	0,28	0,03	1,48	> 99
2021	97,93	99,43	0,45	0,13	1,94	> 99
2022	96,90	99,11	0,86	0,03	2,64	> 99
2023	97,91	99,19	0,71	0,10	2,04	> 99



Jalkapohjatulehdusarviointi

- Kansainvälisesti tunnustettu broilereiden hyvinvoinnin mittari
- Seuranta Suomessa
 - Lakisääteinen jokaisen teurasparven arviointi tarkastuseläinlääkärin toimesta
 - Arvioidaan vähintään sadan broilerin yksi jalkapohja joka teurasparvesta
 - Ihotulehduksen vakavuus pisteytetään vaurion syvyyden perusteella (luokat 0-1-2)
 - Luokka 0 vastaa tervettä jalkapohjaa
 - Luokka 1 vastaa lieviä pinnallisia tulehdusmuutoksia
 - Luokka 2 vastaa syvää tulehdusmuutosta
 - Lasketaan teurasparvelle indeksi: $J=100 \times (n^1 \times 0,5 + n^2 \times 2) / n^{\text{tot}}$
 - < 20 pistettä = erinomainen jalkapohjaterveys
 - < 40 pistettä = ei muutoksia, hyvä jalkapohjaterveys
 - 40-80 pistettä = tulehdusmuutoksia havaittavissa
 - olosuhteisiin, kuten kuivikkeen laatuun ja ilmanvaihtoon on kiinnitettävä huomiota
 - > 80 pistettä = voimakkaat tulehdusmuutokset
 - tarkastuseläinlääkärin ilmoitus tuottajalle ja aluehallintovirastolle toimenpiteitä varten

Kansallinen tilastointi

- Eläinten terveys ETT ry
- Tiedonkeruujärjestelmä kehitetty maa- ja metsätalousministeriön ruokaketjuhankerahoituksella
- Kattaa yli 99 % suomalaisesta broilerintuotannosta

