


# IB eli kanan tarttuva keuhkoputkentulehdus - Rokotusohjelmat Suomessa 2024



# IB-rokotusohjelman tavoite

- Rokotetun parven suojaaminen taudin oireilta
  - Muille tartunnoille altistumisen ehkäisy (piilevä IB)
  - Viruserityksen väheneminen
  - Tartuntaherkkyuden väheneminen
- 
- Leviämisen ehkäisy linnusta toiseen
  - Leviämisen ehkäisy parvesta toiseen
  - Leviämisen ehkäisy tilalta toiselle

# Yleistä IB-rokotuksista

- Aina on pyrittävä rokottamaan kaikki samalla pitopaikalla olevat linnut (myös eri-ikäiset) samaan aikaan ja samalla rokoteviruskannalla.
- Samanaikaisesti käytettävien rokotteiden yhteensopivuuden tulisi perustua tutkittuun tietoon. Rokotevalmistajat suosittelevat vain saman valmistajan rokotteiden yhteiskäyttöä.
- Eri rokotevalmistajilla on eri viruskannat käytössä, mikä on huomioitava, mikäli käytetään eri rokotevalmistajien rokotteita ohjelmassa.
- Elävien rokotteiden varastointi ja käsittely vaatii tarkkuutta. Väärä rokotekäsittely tuhoaa elävän rokotteen virukset jolloin rokotusten teho heikkenee. Lisäohjeita: [Rokotuskoulutus 2.6.2023](#)
- [Lainsäädännön edellytykset rokotteiden luovuttamiselle siipikarjatilalle](#)

# Emoparvien (isovanhempais- ja vanhempaispolvi) rokotusohjelma IB-tautia vastaan

Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
0-1 vrk	Ma + 4/91	Elävä	Sumute tai geeli	Hautomo tai kasvattamo
6 viikkoa	Ma	Elävä	Juomavesi	
12 viikkoa	4/91	Elävä	Juomavesi	Annettava vähintään 2 viikkoa ennen siirtoa
Siirto	Nobilis IB multi vet	Tapettu	Injektio	Määräaikainen erityislupa
Muninnan aikana 6-8 viikon välein	Ma ja 4/91 vuorotellen	Elävä	Juomavesi	Aloitus Ma-kannan rokotteella aikaisintaan 27 vk iässä, kun muninta lähtenyt hyvin alkuun

Mikäli tämä ohjelma ei sovellu parvellesi (esim. parvi ei ole saanut perusrokotuksia kasvatusaikana), ole yhteydessä eläinlääkäri Pia Vennerströmiin/Ruokavirasto, puh. 050 354 4603 saadaksesi lisäohjeita.

# Munintakanojen (tuotantopolvi) rokotusohjelma IB-tautia vastaan

Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
1 vrk	Ma + 4/91	Elävä	Sumute	Hautomo tai kasvattamo
6 viikkoa	Ma	Elävä	Juomavesi	
12 viikkoa	4/91	Elävä	Juomavesi	Annettava vähintään 2 viikkoa ennen siirtoa
Muninnan aikana 6-8 viikon välein	Ma ja 4/91 vuorotellen	Elävä	Juomavesi	Aloitus Ma-kannan rokotteella, ei ole suositeltavaa rokottaa muninnan alkuvaiheessa

Mikäli tämä ohjelma ei sovellu parvellesi (esim. parvi ei ole saanut perusrokotuksia kasvatusaikana), ole yhteydessä eläinlääkäri Pia Vennerströmiin/Ruokavirasto, puh. 050 354 4603 saadaksesi lisäohjeita.

# Broilereiden (tuotantopolvi) rokotusohjelma IB-tautia vastaan

Ajankohta	Rokotekanta	Rokote	Annostelu	HUOM!
Ensimmäinen päivä	Ma + 4/91	Elävä	Spray	Hautomo tai kasvattamo

# Fimean hyväksymät, Suomessa käytettävissä olevat IB-rokotteet

- Myyntilupa
  - Poikkeuslupa (saa tuoda maahan muissa kuin suomen- ja ruotsinkielisissä pakkauksissa)
    - Nobilis IB 4-91 (MSD, lupa myönnetty 15.5.2023)
- Määräaikainen erityislupa (eläinlääkärin ei tarvitse hakea valmistekohtaista erityislupaa)
  - Nobilis IB Ma5 (MSD, lupa myönnetty 23.5.2023)
  - CEVAC IBird (Ceva, vastaa 4/91-tyypin virusrokotetta, lupa myönnetty 24.5.2023; Broilereille ja munintakananuorikoille. Toistuva käyttö muniville kanoille on osoitettu turvalliseksi muninnan aikana)
  - CEVAC Mass L (Ceva, lupa myönnetty 24.5.2023; Broilereille ja munintakananuorikoille. Ei saa käyttää muniville kanoille, eikä 4 viikkoon ennen muninnan alkamista)
  - Nobilis IB multi vet (MSD, lupa voimassa 12.6.2023 alkaen; inaktivoitu injektiorokote; käytetään Suomessa emonuuorikoille siirron yhteydessä)